NanoKon - Systematische Bewertung der Gesundheitsauswirkungen nanoskaliger Kontrastmittel

AP 1 Materialsynthese,-eigenschaften

Nanopartikel – Herstellung, Modifikation und physikochemische Charakterisierung

SARASTRO
NANOGATE
INM

AP 2 *in vitro*

Analyse biologischer NP-Auswirkungen auf Zellen des Magen-Darm Traktes

STAUMA
PharmBio
PATHOMA

CHIR
INM

AP 3 *in vitro*

Transportprozesse und subzelluläre Lokalisation

INM
PharmBio

STAUMA
PATHOMA

AP 4 *in vivo*

Analyse biologischer Nanopartikel-Auswirkungen im Mausmodell

CHIR
RADIO

PATHOMA

AP 5 *in silico*

Modellierung

PHYS

AP 6 Bewertung und Kommunikation

Risikobewertung, Datenweitergabe, SOPs

ALLE PARTNER

AP 1 Materialsynthese,-eigenschaften

Stabilitätsverbesserung

BaSO₄

Citrat-stabilisiert

**Gastro-
intestinal-
(GI)-trakt**

**Keine ausreichende
Langzeitstabilität in...**

Wasser

pH = 5.0-7.0

Speichel

pH = 6.5-7.2

Magensaft

pH = 1.2-4.0

Darmflüssigkeit

pH = 5.0-8.3

Co-Fällung mit Gd/Eu³⁺

Gd³⁺ - Dotierung
Citrat - stabilisiert

Eu³⁺ - Dotierung
Citrat - stabilisiert

Gd³⁺ - Dotierung
Biphosphat- stabilisiert

Weitergabe an Radiologen (MRT-Kontrast)
und Chirurgie (*in vivo* – Toxizität)

Weitere Informationen:
Poster Nanogate/INM

Aber: Freisetzung von Ionen in künstl. Magensaft

Kovalente Immobilisierung von Gd^{3+} in Silica-Partikelmatrix

Weitergabe an Radiologen (MRT-Kontrast) und Chirurgie (*in vivo*-Toxizität)

Weitere Informationen:
Poster INM

AP 1

Prüfung auf mikrobiologische Kontamination/Sterilität

Bakterienwachstum (KBE-Test)

Endotoxine (LAL-Gel Clot / rFC-Assay)

- > Endotoxine beeinflussen Ergebnisse von *in vitro* und *in vivo* Assays und deshalb die Risikobewertung sowie die Zulassung von Nanomaterialien für biomedizinische Anwendungen
- > Basis: **Verlässlichkeit der Endotoxin-Testsysteme in Bezug auf NP-Suspensionen**
 - > Systematische Studie mit Fokus auf Interferenz von Silica- und $\text{Fe}_x\text{O}_y@SiO_2$ -Nanopartikeln mit dem LAL Gel Clot Assay
 - > Kucki et.al, *submitted 2012*
 - > Vergleichsstudie mit alternativem Endotoxin-Testsystem (laufend)
 - > Bisherige Ergebnisse:
 - > Nicht-optische Assay-Interferenz durch Protein-Partikel-Interaktionen

AP 2

Untersuchung der Protein-Corona von Silica-Partikeln mittels zeitaufgelöster quantitativer LC-MS

- > In biologischen Medien sehr schnelle Bildung einer Protein-Corona (< 30 sec)
- > Corona beeinflusst die Aufnahme, Toxizität und biologischen Effekte der NP.
- > Komplexe Wechselwirkung mit einer Vielzahl von Proteinen (ca. 300 verschiedene Plasmaproteine)
- > Zusammensetzung der Protein-Corona abhängig von physikochemischen Eigenschaften der Nanopartikel
- > Profil-Erstellung
 - > erlaubt bioinformatische Vorhersage (patho-) biologischer Reaktionen sowie ursächlicher Proteine
 - > Berücksichtigung beim Design von Nanomaterialien
- > Tenzer et al. ACS Nano 2011

AP 2

Analyse biologischer NP-Auswirkungen auf Zellen des Magen-Darm Traktes

Darmepithel: Caco-2, HT-29

Endothel: HMEC-1, ISO-HAS-1

Ko-Kulturmodell: Caco-2/ISO-HAS-1

Gesunde Ko-Kultur

Entzündete Ko-Kultur
(TNF- α stimuliert)

**Keine signifikante Änderung des TER nach Partikelzugabe
= Barrierefunktion bleibt erhalten**

AP 2

Toxizitäts-Assays, Impedanz-Messung

- > bisher kein Hinweis auf eine hohe Toxizität der $\text{Fe}_x\text{O}_y@SiO_2$ -Partikel sowie der getesteten Primärreferenzen (z.B. Endorem®, Micropaque®)
- > NP-Zugabe in hohen Konzentrationen führt jedoch nach 24h zu einem deutlichen Abfall der Impedanz von HMEC-1 Zellen

AP 3

Mikroskopische Untersuchungen

- > Untersuchung auf pathologische Veränderungen der Zellmorphologie
 - > Primärreferenzen:
 - > bisher keine morphologischen Veränderungen festgestellt; weitere Versuche mit hohen Partikelkonzentrationen laufen
 - > Sekundärreferenzen:
 - > nach 24h morphologische Veränderungen des HT-29 Zellverbandes bei hohen Konzentrationen (100 $\mu\text{g/ml}$) der $\text{Fe}_x\text{O}_y@\text{SiO}_2$ und $\text{Fe}_x\text{O}_y@\text{SiO}_2$ -Atto647N Partikel, (kein Farbstoff-Effekt)
- > Untersuchung der subzellulären NP-Lokalisation
 - > durch Einsatz fluoreszenz-markierter NP ($\text{Fe}_x\text{O}_y@\text{SiO}_2$ -Atto647N)
 - > NP-Detektion mittels Fluoreszenzmikroskopie, CLSM, STED-Mikroskopie

Weitere Informationen:

Poster Astanina (PharmBio), Kasper (PathoMa), Kucki (INM)

AP 3

Subzelluläre NP-Lokalisation

- > Ergebnisse:
 - > Aufnahme der Partikel < 2 h (HT-29, Caco-2)
 - > Akkumulation der $\text{Fe}_x\text{O}_y@SiO_2$ -Atto647N Nanopartikel in der Nähe des Zellkerns
 - > HMEC-1-Zellen: Nanopartikel akkumulieren in späten Endosomen (LE), keine Ko-Lokalisation mit frühen Endosomen (EE) oder dem Golgi-Apparat

Weitere Informationen:
Poster Astanina (PharmBio), Kucki (INM)

AP 3

Partikelaufnahme und Transport: Rolle des Zytoskeletts

> Untersuchung an HMEC-1 Zellen durch Einsatz von Inhibitoren

<p>Aktin-Stabilisierung <i>Jasplakinolid</i></p>			<p>Inhibition der Partikelaufnahme</p>
<p>Hemmung der Aktin Polymerisation <i>Cytochalasin D</i></p>			
<p>Tubulin-Stabilisierung <i>Paclitaxel (Taxol)</i></p>			<p>NP-Akkumulation am MTOC</p>
<p>Hemmung des Mikrotubuli Aufbaus <i>Nocodazol</i></p>			
	<p>Überlagerung</p>	<p>NP</p>	

Rot = NP ($\text{Fe}_x\text{O}_y@SiO_2$ -Atto647N)
 Grün = Tubulin/Aktin
 Blau = Zellkern

AP 4 Darstellung der Partikel in der MRT (Magnetresonanztomographie)

BaSO₄ – Gd³⁺ dotiert

A T1-gewichtete Bildgebung, FLASH
B T2-gewichtete Bildgebung, TSE
C Signalintensitätsmessung aus **b**
D Messung der Relaxationszeit T1
a, b Beschriftungen entsprechen der Gd-DTPA-Konzentration in mmol/l

Orale Einzeldosen einer Konzentration von 0,5% bis 2% für die *in vivo*-Testung ausreichend

AP 5

Tracking von NP in Live-Cell Imaging Daten

Standardverfahren zur Bildanalyse sind effizient, wenn es sich um gut differenzierbare einzelne Objekte handelt.

Probleme:

Unschärfe Ränder, variable scheinbare Teilchengröße und –zahl, verschiedene Helligkeiten

Methode 1

PIV (Particle Imaging Velocimetry):

Im Prinzip anwendbar, aber bei Auswertung von Videodaten zeigte sich wenig Struktur

Methode 2

Besser: Analyse des Korrelationsfeldes zwischen den Verschiebungsvektoren

Position der Partikel ist durch die Amplitude der Korrelationsfunktion deutlich erkennbar.

Ausblick

3D-Simulationen zum NP-Transport

AP 6

Bewertung und Kommunikation

Methoden-Standardisierung

Erstellung von Standard Operation Procedures

NanoKon-SOP 2.2.2

Entwicklung eines Referenzsystems zur
Evaluierung von NP-Effekten

Selektion biologischer Parameter zur
Bewertung der Materialien

Weiterentwicklung in Plattform für
Risikobewertung

Weitergabe relevanter Erkenntnisse

NanoKon – Partner

Dipl.-Chem.
H. Schirra

Dr. R. Danzebrink

Dr. A. Kraegeloh

Prof. R. Stauber
Molekulare u.
Zelluläre
Onkologie

Prof. A. K. Kiemer
Pharmazeutische
Biologie

Prof. L. Santen
Theoretische
Physik

Prof. C. J.
Kirkpatrick
Pathologie

Prof. M. Menger
Klinisch-
Experimentelle
Chirurgie

Prof. A. Bücker
Diagnostische u.
Interventionelle
Radiologie